



**CM Platany**

## **PRZYGOTOWANIE DO BADANIA ULTRASONOGRAFICZNEGO (USG) JAMY BRZUSZNEJ DZIECI**

**Noworodki** nie wymagają specjalnego przygotowania.

**Dzieci w pierwszym roku życia** – konieczna jest przerwa w karmieniu ok. 2 - 3 godz. od ostatniego posiłku.

**Dzieci powyżej pierwszego roku życia** – przed badaniem pozostają ok. 5 godz. bez jedzenia.

**Dzieci starsze:**

1. Na 2-3 dni przed badaniem USG należy zacząć zażywać leki odgazowujące. Leki można bez recepty nabyć w każdej aptece.
2. W dniu poprzedzającym badanie należy:
  - nie spożywać pokarmów ciężkostrawnych, wzdymających oraz napojów gazowanych
  - po każdym posiłku (porannym, popołudniowym i wieczornym) zażyć środki odgazowujące.
  - osoby otyłe lub ze skłonnością do zaparć powinny zastosować środki przeczyszczające - jednak nie później niż 24 godziny przed badaniem. Środkiem przeczyszczającym nie może być lewatywa.
3. W dniu badania należy:
  - zażyć rano środki odgazowujące
  - na badanie zgłosić się na czczo
  - zadbać o wypróżnienie
  - nie palić papierosów i nie pić kawy
  - pacjenci, którym badanie wyznaczono po godzinie 14-tej mogą zjeść najpóźniej do godziny 8:00 bułkę z masłem i wypić gorzką herbatę
  - jeżeli wcześniej były wykonywane badania USG należy przynieść ze sobą ich wynik
4. Do badania pęcherza moczowego, gruczołu krokowego i narządu rodnego należy:
  - na 1-2 godziny przed badaniem wypić około litra niegazowanego płynu
  - zgłosić się do badania z pełnym pęcherzem



**CM Platany**

## **PPRZYGOTOWANIE DO BADANIA ULTRASONOGRAFICZNEGO (USG) JAMY BRZUSZNEJ**

**Noworodki** nie wymagają specjalnego przygotowania.

**Dzieci w pierwszym roku życia** – konieczna jest przerwa w karmieniu ok. 2 - 3 godz. od ostatniego posiłku.

**Dzieci powyżej pierwszego roku życia** – przed badaniem pozostają ok. 5 godz. bez jedzenia.

1. Na 2-3 dni przed badaniem USG należy zacząć zażywać leki odgazowujące. Leki można bez recepty nabyć w każdej aptece.
2. W dniu poprzedzającym badanie należy:
  - nie spożywać pokarmów ciężkostrawnych, wzdymających oraz napojów gazowanych
  - po każdym posiłku (porannym, popołudniowym i wieczornym) zażyć środki odgazowujące.
  - osoby otyłe lub ze skłonnością do zaparć powinny zastosować środki przeczyszczające - jednak nie później niż 24 godziny przed badaniem. Środkiem przeczyszczającym nie może być lewatywa.
3. W dniu badania należy:
  - zażyć rano środki odgazowujące
  - na badanie zgłosić się na czczo
  - zadbać o wypróżnienie
  - nie palić papierosów i nie pić kawy
  - pacjenci, którym badanie wyznaczono po godzinie 14-tej mogą zjeść najpóźniej do godziny 8:00 bułkę z masłem i wypić gorzką herbatę
  - jeżeli wcześniej były wykonywane badania USG należy przynieść ze sobą ich wynik
4. Do badania pęcherza moczowego, gruczołu krokowego i narządu rodnego należy:
  - na 1-2 godziny przed badaniem wypić około litra niegazowanego płynu
  - zgłosić się do badania z pełnym pęcherzem



**CM Platany**